

# COVID-19 -Árbol de Decisiones Para la Industria Alimenticia

- \* Síntomas**
- Fiebre (100.4°F o más)
  - Escalofríos / temblores
  - Tos
  - Falta de aliento
  - Dolor de pecho
  - Cansancio fuera de lo normal
  - Labios o cara azules
  - Dolor Muscular
  - Secreción nasal / congestión nasal
  - Dolor de garganta
  - Pérdida del sentido del olfato o del gusto
  - Problemas gastrointestinales (Diarrea)

- \*\* Contacto Cercano**
- Quien se considera contacto cercano?
- Miembro del hogar.
  - La Pareja.
  - Individuo que brinda atención en un hogar sin utilizar las precauciones de control de infección recomendadas.
  - Individuo que le tosieron directamente.
  - Individuo que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 10 minutos, 2 días antes del inicio de la enfermedad (ó para pacientes asintomáticos 2 días antes de la recolección de las muestras positivas) hasta el momento en que se cumplieron los criterios para el regreso al trabajo. El contacto se considera contacto cercano independientemente de si la persona con COVID-19 ó la otra persona, usaron una cubierta facial en el momento de la exposición.

- \*\*\* Vacunas**
- Se considera que una persona está totalmente vacunada cuando:
- Cumple 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis (Pfizer o Moderna)
  - Cumple 2 semanas después de una vacuna de una sola dosis (Janssen de Johnson & Johnson)

- \*\*\* Precauciones del CDC ( Consulte con su Departamento de Salud)**
- Los empleadores deben tomar la temperatura del empleado y evaluar los síntomas antes de que el individuo ingrese a las instalaciones todos los días.
  - El empleado debe auto- evaluarse bajo la supervisión del programa de salud ocupacional de su empleador.
  - El empleado debe usar una máscara facial o de tela aprobada por el empleador en todo momento mientras esté en el lugar de trabajo.

